



Un potentiel de production viticole 2014 estimé, à la mi-août, en hausse par rapport à 2012 et 2013

Selon les prévisions établies au 20 août 2014 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2014, estimée à ce stade à près de 47 millions d'hectolitres, dépasserait les récoltes historiquement faibles de 2012 ou 2013 ainsi que la moyenne quinquennale. Le potentiel de production a été revu en hausse depuis la prévision de juillet, suite aux dernières précipitations estivales qui ont favorisé le grossissement des baies.

Sommaire

Estimation de récolte au 20 août 2014	page 2
Les précipitations estivales favorisent le grossissement des baies Récolte estimée à près de 47 millions d'hectolitres au 20 août 2014	
Situations régionales	page 3
Pression contenue des maladies à la mi-août Production annoncée presque partout en hausse par rapport à 2013	

Méthodologie	page 4
---------------------	--------

Pour en savoir plus	page 4
----------------------------	--------

Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2014 ont été arrêtées au 20 août sur la base des données recueillies à la mi-août. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements particuliers susceptibles de survenir après la mi-août et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 20 août 2014

Les faits marquants : Les précipitations estivales favorisent le grossissement des baies

Selon les prévisions établies au 20 août par le SSP, la récolte viticole 2014 s'élèverait à près de 47 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 11 % aux récoltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur de 3 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour mémoire, le niveau historiquement faible des récoltes 2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions climatiques défavorables, notamment au moment de la floraison.

Ces estimations sont établies sans connaissance des événements climatiques et des problèmes sanitaires qui pourraient survenir jusqu'aux vendanges. Elles sont susceptibles d'être révisées lors des prochains exercices.

Après une année 2013 marquée par un retard important du vignoble, la campagne en cours retrouve un cycle proche de la normale. Au 20 août, la plupart des vignobles sont au stade véraison (maturation des baies). Les conditions climatiques douces de l'hiver et du printemps expliquent cette relative précocité. La véraison est cependant fortement ralentie par les épisodes de fraîcheur, anormalement fréquents au cours de cet été. Certaines régions de l'Est conservent une avance des stades de la vigne comparée à la

moyenne quinquennale.

La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) s'étaient déroulées généralement dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) a été en général faible. L'état sanitaire de la vigne était bien préservé à la mi-juillet, comparé aux années précédentes, conséquence d'une fin de printemps sèche et chaude. Des orages de grêle ont parfois occasionné des dégâts importants dans des départements, mais ces orages sont en atténuation en août. Malgré une pluviométrie estivale inhabituelle, la majorité des vignobles présentent, à la mi-août, un état sanitaire relativement préservé comparé aux années précédentes. Les foyers de Mildiou, Oïdium ou Botrytis sont, pour l'heure, maîtrisés et dans de nombreux vignobles sans conséquence sur le rendement. Ces précipitations exceptionnelles écartent le risque de sécheresse et conduisent, à la mi-août, à rehausser le potentiel de production, depuis la dernière prévision (46,4 millions d'hectolitres estimés au 21 juillet).

Les indicateurs : Récolte estimée à près de 47 millions d'hectolitres au 20 août 2014

Estimation de récolte de vins au 20 août 2014

Unité : 1000 hl

Catégories de vins	Moy (*)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy (*)
Vins AOP	21 169	18 764	22 153	18%	5%
Vins pour eaux-de-vie	7 825	7 810	8 708	12%	11%
Vins IGP	12 752	12 589	12 698	1%	0%
Autres vins (dont vins sans IG)	3 832	3 209	3 374	5%	-12%
TOTAL VINS	45 577	42 373	46 933	11%	3%


(*) moyenne des années 2009 à 2013

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Récolte 2014 prévue pour l'heure à un niveau proche de celle de 2009

Évolution de la production française au 20 août 2014, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Pression contenue des maladies à la mi-août

En **Champagne**, l'état sanitaire du vignoble est relativement préservé à la mi-août. L'apparition de foyers de pourriture grise dépendra des conditions climatiques des semaines à venir. Le vignoble, au stade début véraison, conserve une semaine d'avance comparé à une année normale.

En **Bourgogne et Beaujolais**, la véraison se déroule bien et les vendanges devraient démarrer début septembre. Les précipitations estivales fréquentes favorisent un grossissement important des baies. Cependant, la grêle a frappé une partie du Beaujolais. L'état sanitaire est en général préservé, mais des foyers de Botrytis sont présents dans les vignes. Malgré tout, les perspectives de rendements se maintiennent. Pour mémoire, la grêle avait causé en juin des dégâts étendus au vignoble en Côte-d'or et en Saône-et-Loire.

En **Alsace**, l'état sanitaire est satisfaisant, malgré les pluies importantes estivales. L'estimation est revue en hausse depuis la dernière prévision.

En **Savoie**, le risque de pourriture grise est élevé, suite aux pluies incessantes. Dans le **Jura**, les maladies cryptogamiques sont pour l'heure maîtrisées. Le potentiel de production est prévu au-dessus de la moyenne.

Dans le **Val de Loire**, les pluies généreuses de l'été favorisent les maladies, mais contribuent à l'augmentation des rendements. Pour mémoire, la floraison avait été rapide et homogène, aidée par des conditions climatiques très favorables. Le potentiel de production s'annonce supérieur à celui de 2013 de 10 %.

Dans les **Charentes**, le climat estival assez frais réduit la précocité initiale du vignoble. L'Ugny blanc a atteint le stade véraison. Les pluies importantes des dernières semaines ont favorisé le grossissement des

baies. Mais le Mildiou sur feuille se développe fréquemment et le Botrytis, apparu de façon inhabituelle à cette époque, pourrait se propager. Le potentiel de production est néanmoins rehaussé depuis la dernière prévision.

Dans le **Bordelais**, la véraison est lente et hétérogène. L'état sanitaire est maîtrisé, malgré des foyers d'Oïdium, de Mildiou et de Botrytis. Pour mémoire, la floraison s'était bien déroulée, contrairement à 2013. Avec les dernières précipitations estivales, le potentiel de récolte est révisé en hausse depuis la dernière prévision. Dans le reste du **Sud-Ouest**, les maladies, en recrudescence, sont sous contrôle. Les dates de vendange dépendront de l'évolution du Botrytis. Le potentiel de production devrait revenir à la moyenne, après une récolte 2013 très réduite.

En **Languedoc-Roussillon**, les premières vendanges ont démarré autour du 10 août par le Muscat. Ce calendrier signe un retour à une certaine conformité, après la récolte très tardive de 2013. La véraison est hétérogène à cause du climat variable. L'état sanitaire est maîtrisé malgré la pression des maladies. La sécheresse printanière marquée, ainsi que des dégâts de grêle étendus, ont affecté les rendements de l'Aude et de l'Hérault. La grêle a aussi touché le Gard fin juillet. Pour mémoire, la floraison s'était déroulée normalement sur l'ensemble des cépages.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, les maladies cryptogamiques se développent suite aux pluies de l'été. La relative fraîcheur estivale ralentit la véraison. Malgré un impact localisé de la grêle dans la région, la production régionale dépasserait son niveau moyen. Pour mémoire, la floraison, déroulée dans des conditions favorables, s'était accompagnée d'une très faible coulure. En **Corse**, la pression de l'Oïdium est importante. La grêle a occasionné des dégâts en plaine orientale.

Les indicateurs : Production annoncée presque partout en hausse par rapport à 2013

Estimation de récolte par vignoble au 20 août 2014 (*)

Unité : 1000 hl

	Tous vins					Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie				
	Moy (**)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy	Moy (**)	2013	2014	2014/2013	2014/Moy
Champagne	2 645	2 825	3 203	13%	21%	2 462	2 611	2 690	3%	9%
Bourgogne - Beaujolais	2 270	2 056	2 229	8%	-2%	2 192	1 990	2 166	9%	-1%
Alsace	1 099	993	1 170	18%	6%	1 067	976	1 128	16%	6%
Savoie	116	102	117	15%	1%	102	92	103	12%	1%
Jura	85	58	93	60%	10%	78	54	85	58%	9%
Val de Loire	2 798	2 630	2 883	10%	3%	2 260	2 159	2 323	8%	3%
Charentes	8 441	7 877	8 819	12%	4%	ns	ns	ns	ns	ns
Sud-Ouest	3 454	2 615	3 550	36%	3%	1 221	890	1 249	40%	2%
Bordelais	5 563	3 965	6 018	52%	8%	5 190	3 854	5 700	48%	10%
Languedoc-Roussillon	12 922	13 580	12 360	-9%	-4%	2 618	2 545	2 591	2%	-1%
Corse	320	348	325	-7%	2%	88	84	85	1%	-3%
Autres vignobles Sud-Est	5 116	4 675	5 441	16%	6%	3 368	3 072	3 520	15%	5%

ns : non significatif

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble

(**) moyenne des années 2009 à 2013

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2014 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2013.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture :
Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2014

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)