


Enquête pratiques d'élevage 2015

Conduite sanitaire des élevages bovins

En pâture, plus d'exploitations exposées aux risques liés aux contacts entre bovins

Part des exploitations exposées aux risques liés aux contacts entre bovins



- En pâture, dans la région, une part d'exploitations plus importante ayant une zone de contact avec des bovins d'autres exploitations
- Part d'exploitations introduisant de nouveaux animaux dans leurs troupeaux plus importante en région notamment pour les élevages de vaches laitières

* Séparation de type simples barrières ou fils barbelés qui rend possible les contacts avec les animaux d'une exploitation voisine


** au cours de l'année

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

Des stratégies de protection différentes

- Pratique de la quarantaine plus utilisée dans les élevages de vaches laitières en région (+ 5 points)
- Moins d'exploitations équipées d'infirmérie dans la région
- Précautions mises en œuvre pour limiter l'introduction d'éléments pathogènes dans les bâtiments dans 65 % des élevages spécialisés (de vache laitières ou allaitantes), le dispositif majoritaire étant la présence d'un robinet extérieur (53 %)

Répartition des exploitations en fonction des pratiques de protection mises en place



Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

* Infirmérie : espace dédié aux animaux malades (convalescence, application de soins...)

Réseau d'eau public plus utilisé dans les bâtiments en région

Origine de l'eau d'abreuvement des élevages bovins (%)

| | En bâtiment | | | En pâture | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| | Ressource propre* | Réseau d'eau public | Alimentation en eau mixte** | Ressource propre | Réseau d'eau public | Alimentation en eau mixte |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 | 62 | 16 | 42 | 17 | 39 |
| France métr. | 33 | 51 | 14 | 49 | 23 | 24 |

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

* Ressource propre : eau de puits, forages, cours d'eau...

** Alimentation en eau mixte : eau du réseau et ressource propre

- En bâtiment, eau d'abreuvement principalement issue du réseau d'eau public
- En pâture, ressource propre majoritaire mais inférieure à la moyenne nationale (- 7 points)
- En pâture, alimentation en eau mixte plus utilisée dans la région (+ 15 points)
- Moins d'analyses d'eau en particulier dans les élevages de vaches laitières

Analyses bactériologiques


| | Analyses bactériologiques | | Analyses physico-chimiques | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Élevages de vaches allaitantes | Élevages de vaches laitières | Élevages de vaches allaitantes | Élevages de vaches laitières |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 | 39 | 11 | 28 |
| France métr. | 25 | 74 | 18 | 63 |

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

Moins d'exploitations bovines ayant recours aux traitements des bâtiments contre les nuisibles en région

- Différence marquée notamment pour les élevages de vaches laitières (- 26 points)

Part des exploitations traitant les bâtiments contre les nuisibles* avec des produits hors désinfectants




Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

* Traitements contre les nuisibles : raticides, rodenticides, insecticides, acaricides, répulsifs...

Usage d'antiparasitaires proche de la moyenne nationale


Proportion d'élevages bovins utilisant des traitements antiparasitaires



Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

- Proportion d'élevages bovins utilisant des traitements antiparasitaires proche de la moyenne nationale

Part des élevages bovins utilisant des traitements antiparasitaires selon le type de parasites et la fréquence d'utilisation




Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

- Traitement régulier pour 3/4 des exploitations traitant contre les parasites internes

Pratique de la vaccination plus courante dans la région

- Recours à la vaccination plus fréquent, en particulier pour les élevages de vaches allaitantes (+ 6 points)


Recours à la vaccination selon le type d'élevage



Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

Recours au traitement antibiotique par lot moins courant dans la région

Part des élevages ayant recours au traitement antibiotique par lot* selon le type d'élevage



Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

- Recours au traitement antibiotique par lot moins fréquent en région, en particulier pour les élevages de vaches laitières (- 11 points)
- Bovins de moins de 8 mois majoritairement concernés
- Prévention pour deux principales maladies :
 - maladies respiratoires pour 63 % des exploitations de la région utilisant ces traitements
 - diarrhées pour 44 %
- Risque de contamination cité par 67 % des élevages régionaux comme principale raison de ce traitement antibiotique **

* Administration d'antibiotique à l'ensemble d'un lot quand seulement quelques animaux sont malades

** Choix multiple parmi : risque de contamination, réduire les coûts de traitement futur, maintenir la production, vous rassurer, autre.

Plus de recours aux pratiques préventives et aux traitements alternatifs en région

Part des exploitations cherchant à réduire l'utilisation des produits vétérinaires (%)

| | Élevages de vaches allaitantes (%) | Élevages de vaches laitières (%) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 78 |
| France métro. | 64 | 79 |

Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

Part des exploitations ayant des pratiques préventives et des traitements alternatifs* (%)

| | Utilisation de compléments alimentaires | | Utilisation de traitements alternatifs | |
|----------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | Élevages de vaches allaitantes (%) | Élevages de vaches laitières (%) | Élevages de vaches allaitantes (%) | Élevages de vaches laitières (%) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 27 | 39 | 18 | 45 |
| France métro. | 20 | 33 | 15 | 32 |


Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

* Traitements alternatifs : homéopathie, aromathérapie, phytothérapie, ...

- Mise en œuvre de pratiques pour réduire l'utilisation de produits vétérinaires dans une majorité d'exploitations
- Trois raisons principales citées, comme au plan national :
 - réduction des coûts de production
 - bien-être des animaux
 - réduction des risques de résistance
- Plus d'élevages utilisant des compléments alimentaires pour renforcer la résistance aux maladies des animaux
- Plus d'élevages de vaches laitières utilisant des traitements alternatifs qu'au plan national (+ 13 points)

Plus de parage et d'écornage dans les élevages de vaches laitières

Pratique du parage et de l'écornage selon le type d'élevage bovin




Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

- Pratique du parage plus fréquente en région, en particulier dans les élevages de vaches laitières
- Pratique de l'écornage moins répandu en région

Part des exploitations pratiquant le parage selon le type d'élevage

- Parage préventif privilégié par les élevages de vaches laitières en région (+ 30 points)
- Parage curatif majoritaire dans les élevages de vaches allaitantes mais inférieur à la moyenne nationale (- 12 points)



Source : Agreste – Enquête sur les pratiques d'élevage 2015

Cédric Conte

Méthodologie

Dans le cadre de l'enquête nationale Pratiques d'Élevage 2015, 9 412 exploitations ayant un élevage bovin ont été enquêtées entre avril et juillet 2016, dont 1 035 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le champ sur lequel est tiré l'échantillon est celui des exploitations détenant au moins 10 vaches allaitantes ou 50 bovins. Ce seuil permet de couvrir au niveau national 96 % des bovins, 95 % des vaches laitières, 97 % des vaches allaitantes et 73 % des exploitations ayant au moins un bovin.

Cette enquête permet de disposer d'indicateurs sur les pratiques des éleveurs réparties en plusieurs thèmes : conditions de logements des animaux, gestion des effluents, alimentation des animaux, pratiques sanitaires, soins apportés aux animaux et organisation du travail.

Cette publication s'intéresse aux volets « Pratiques sanitaires », « Santé » et « Soins » de l'enquête et les analyses portent sur :

- les élevages de vaches allaitantes sans vaches laitières
- les élevages de vaches laitières sans vaches allaitantes
- les élevages de bovins avec vaches laitières, vaches allaitantes, bovins d'engraissement ou veaux de boucherie

Pour en savoir plus :

- Agreste national Chiffres et Données n° 246 décembre 2017
- Agreste national Primeur « Pratiques sanitaires en élevages de bovins » n°352 décembre 2018
- Agreste national Primeur « Pratiques de stabulation et de gestion des effluents en élevages de bovins » n° 356 février 2019
- Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Flash Info « Caractéristiques générales des élevages bovins » n° 9 mai 2019
- Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Flash Info « Bâtiments et gestion des effluents d'élevages bovins » n° 10 mai 2019



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
16B rue Aimé Rudel - BP45 - 63370 Lempdes
Tél : 04 73 42 16 02
Courriel : infostat.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture-gouv.fr
www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Michel Sinoir
Directeur de publication : Seán Healy
Rédactrice en chef : Marie-Laure Rongère
Composition : Cédric Conte
Dépôt légal : mai 2019
ISSN : 2552-4151 (En ligne)

©AGRESTE 2019